



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind TONSILLOPAS Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von TONSILLOPAS Tropfen beachten?
3. Wie sind TONSILLOPAS Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind TONSILLOPAS Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. WAS SIND TONSILLOPAS TROPFEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

TONSILLOPAS Tropfen sind eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
- Zahnfleischentzündung, Aphten
- begleitend bei Mandelentzündung

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

TONSILLOPAS Tropfen ist ein homöopathisches Komplexmittel, das sich aus folgenden Einzelmitteln zusammensetzt: Baptisia tinctoria, Hydrargyrum bichloratum, Ammonium bromatum, Kalium bichromicum, Kalium chloratum, Apisinum.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON TONSILLOPAS TROPFEN BEACHTEN?

TONSILLOPAS Tropfen dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Baptisia tinctoria, Hydrargyrum bichloratum, Ammonium bromatum, Kalium bichromicum, Kalium chloratum, Apisinum bzw. Bienengift, Chrom oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker, bevor Sie TONSILLOPAS Tropfen einnehmen.

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als eine Woche anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Solche Reaktionen sind zumeist harmlos.

Sollten sich die Beschwerden nicht bessern, dann ist das Arzneimittel abzusetzen. Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittelprüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Kinder: Die Anwendung von TONSILLOPAS Tropfen bei Kindern unter 1 Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Einnahme von TONSILLOPAS Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln: Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen / angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen / anzuwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Einnahme von TONSILLOPAS Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.



Schwangerschaft und Stillzeit: Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. Daten über die Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen: Das Arzneimittel hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen. Der Alkoholgehalt von 25 Vol.-% ist zu beachten.

TONSILLOPAS Tropfen enthalten Alkohol: TONSILLOPAS Tropfen enthalten geringe Mengen Alkohol, weniger als 100 mg pro Einzeldosis von 15 Tropfen. Der Alkoholgehalt pro Einzeldosis von 15 Tropfen beträgt 90 mg Ethanol (Alkohol). Dies entspricht 60 mg bei 10 Tropfen, 42 mg bei 7 Tropfen und 30 mg bei 5 Tropfen.

3. WIE SIND TONSILLOPAS TROPFEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Soweit nicht anders verordnet: Zu Behandlungsbeginn und bei akuten Beschwerden: stündlich 10 - 15 Tropfen (maximal 6 x täglich). Bei beginnender Besserung und bei chronischen Beschwerden: 3 x täglich 10 - 15 Tropfen.

Kinder

Kinder (7 - 12 Jahre): Zu Behandlungsbeginn und bei akuten Beschwerden: stündlich 7 - 10 Tropfen (maximal 6 x täglich).

Bei beginnender Besserung und bei chronischen Beschwerden: 3 x täglich 7 - 10 Tropfen

Kleinkinder (1 - 6 Jahre): Zu Behandlungsbeginn und bei akuten Beschwerden: stündlich 5 - 7 Tropfen (maximal 6 x täglich).

Bei beginnender Besserung und bei chronischen Beschwerden: 3 x täglich 5 - 7 Tropfen einnehmen.

Die Anwendung von TONSILLOPAS Tropfen bei Kindern unter 1 Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Zum Einnehmen. Es wird empfohlen, das Arzneimittel bei Kindern mit Wasser verdünnt anzuwenden.

Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenden Therapeuten erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge von TONSILLOPAS Tropfen eingenommen haben als Sie sollten: Aufgrund der Verdünnung der Wirkstoffe sind keine nachteiligen Auswirkungen einer Überdosierung zu erwarten. Bei Einnahme größerer Mengen ist der Alkoholgehalt zu beachten. Der Flascheninhalt von 20 ml bzw. 50 ml enthält 4 g bzw. 10 g Ethanol (Alkohol).

Wenn Sie die Einnahme von TONSILLOPAS Tropfen vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von TONSILLOPAS Tropfen abbrechen: Bei einer Unterbrechung der Behandlung gefährden Sie den Behandlungserfolg!

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Meldung von Nebenwirkungen: Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen · Inst. Pharmakovigilanz · Traisengasse 5 · AT-1200 WIEN · Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE SIND TONSILLOPAS TROPFEN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25 °C lagern. Die Flasche nach Gebrauch fest verschlossen halten und im Originalkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und auf dem Behältnis nach „Verw. bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Was TONSILLOPAS Tropfen enthalten: 10 g (= 10,3 ml) enthalten: Die Wirkstoffe sind: Baptisia tinctoria D1 1 g, Hydrargyrum bicyanatum D8 4 g, Ammonium bromatum D 4 1 g, Kalium bichromicum D4 1 g, Kalium chloratum D2 1 g, Apisinum D6 2 g.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, gereinigtes Wasser. Gesamthethanolgehalt 25 Vol.-%. 1 g entspricht 34 Tropfen.

Wie TONSILLOPAS Tropfen aussehen und Inhalt der Packung: Leicht gelbliche, klare bis schwach getrübe Lösung (Tropfen zum Einnehmen) in Braunglasflaschen mit Tropfaufsatz und Originalverschluss aus Polyethylen.

Packungsgrößen: 20 ml, 50 ml.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH · Schiffenberger Weg 55 · D-35394 Giessen · Deutschland · Telefon +49-641-7960-0 · Telefax +49-641-7960-109 · E-Mail: info@pascoe.de

Z.Nr.: 3-00344

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2014.