

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG / DEM BEHÄLTNIS

Supradyn® forte Brausetabletten – UI1611270

Karton

1. SACHBEZEICHNUNG NEM

Supradyn® forte

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen + Coenzym Q10

Mit Süßungsmitteln.

2. ZUSAMMENSETZUNG

Zutaten:

Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Füllstoff Sorbit, Calciumcarbonat, Magnesiumsulfat, Füllstoff Isomalt, Ascorbinsäure, Magnesiumcarbonat, Farbstoff Beta-Carotin, Orangenaroma, Säureregulator Natriumcarbonat, Eisenpyrophosphat, Coenzym Q10, Nicotinamid, Trennmittel Polyvinylpyrrolidon, DL- α -Tocopherolacetat, Retinylpalmitat, Zinkcitrat, Natriumchlorid, Passionsfruchtaroma, Süßungsmittel Aspartam*, Mannit, Calcium-D-pantothenat, Süßungsmittel Acesulfam K, Farbstoff Beetenrot, Natriumselenat, Natrium-Riboflavin-5'-phosphat, Schaumverhüter Zuckerester von Speisefettsäuren, Mangansulfat, Natriummolybdat, Thiaminhydrochlorid, Cyanocobalamin, Kaliumiodid, Kupfercitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol, Schaumverhüter (Polysorbat 80, Dimethylpolysiloxan, Siliciumdioxid), Phytomenadion, Folsäure, Biotin.

* Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

1 Brausetablette enthält:
Vitamine

% NRV*

Vitamin A	800 µg	100 %
Vitamin B ₁ (Thiamin)	3,3 mg	300 %
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	4,2 mg	300 %
Vitamin B ₆	2 mg	143 %
Vitamin B ₁₂	3 µg	120 %
Vitamin C	180 mg	225 %
Vitamin D	5 µg	100 %
Vitamin E	12 mg	100 %
Vitamin K	25 µg	33,3 %
Pantothensäure	18 mg	300 %
Biotin	50 µg	100 %
Folsäure	200 µg	100 %
Niacin	48 mg	300%

Mineralstoffe und Spurenelemente

Kalzium	120 mg	15 %
Magnesium	80 mg	21 %
Eisen	14 mg	100 %

Kupfer	1000 µg	100 %
Jod	150 µg	100 %
Mangan	2 mg	100 %
Selen	50 µg	91 %
Molybdän	50 µg	100 %
Zink	10 mg	100 %
Andere		
Coenzym Q10	4,5 mg	k.A.

*) Prozent der Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011.

3. NETTOFÜLLMENGE

30 Brausetabletten = 147 g

4. VERZEHRSEMPFEHLUNG

Empf. Anwendung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 Brausetablette pro Tag. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Laktosefrei.
Für Diabetiker geeignet.

5. WARNHINWEISE/WICHTIGE HINWEISE

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.

6. HALTBARKEIT

Mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenlasche

Mindestens haltbar bis Ende:

7. LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

8. NAME UND ANSCHRIFT DES VERTRIEBS

Vertrieb: Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststraße 6-10, 1160 Wien

9. CHARGENBEZEICHNUNG

L.-Nr.:

10. VERKAUFSABGRENZUNG

Erhältlich in der Apotheke.

11. HINWEISE ZUR ANWENDUNG:

12. WEITERE ANGABEN

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente mit Coenzym Q10

30 Brausetabletten mit Orangengeschmack

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Bei erhöhtem Bedarf

Die Vitamine A und C, sowie Kupfer und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Supradyn® is a registered trademark.

EAN-Code 9018800520155

Bayer



ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG / DEM BEHÄLTNIS

Supradyn® forte Brausetabletten – UI1611270

Etikette

1. SACHBEZEICHNUNG NEM

Supradyn® forte

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
+ Coenzym Q10

Mit Süßungsmitteln.

2. ZUSAMMENSETZUNG

1 Brausetablette enthält:

% *NRV**

Vitamine

Vitamin A	800 µg	100 %
Vitamin B ₁ (Thiamin)	3,3 mg	300 %
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	4,2 mg	300 %
Vitamin B ₆	2 mg	143 %
Vitamin B ₁₂	3 µg	120 %
Vitamin C	180 mg	225 %
Vitamin D	5 µg	100 %
Vitamin E	12 mg	100 %
Vitamin K	25 µg	33,3 %
Pantothensäure	18 mg	300 %
Biotin	50 µg	100 %
Folsäure	200 µg	100 %
Niacin	48 mg	300%

Mineralstoffe und Spurenelemente

Kalzium	120 mg	15 %
Magnesium	80 mg	21 %
Eisen	14 mg	100 %
Kupfer	1000 µg	100 %
Jod	150 µg	100 %
Mangan	2 mg	100 %
Selen	50 µg	91 %
Molybdän	50 µg	100 %
Zink	10 mg	100 %
Andere		
Coenzym Q10	4,5 mg	k.A.

*) Prozent der Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011.

3. NETTOFÜLLMENGE

15 Brausetabletten = 73,5 g

4. VERZEHRSEMPFEHLUNG

Empf. Anwendung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 Brausetablette pro Tag. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Laktosefrei.
Für Diabetiker geeignet.

5. WARNHINWEISE/WICHTIGE HINWEISE

Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.

6. HALTBARKEIT

Mindestens haltbar bis Ende: siehe Bodenaufdruck

7. LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

8. NAME UND ANSCHRIFT DES VERTRIEBS

Vertrieb: Bayer Austria Ges.m.b.H., Herbststraße 6-10, 1160 Wien

9. CHARGENBEZEICHNUNG

L Bodenaufdruck

10. VERKAUFSABGRENZUNG

11. HINWEISE ZUR ANWENDUNG

12. WEITERE ANGABEN

Bei erhöhtem Bedarf

15 Brausetabletten mit Orangengeschmack

Bayer



PACKUNGSBEILAGE, WENN VORHANDEN



Supradyn® forte

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente sind lebenswichtige Stoffe, die dem Körper mit der Nahrung zugeführt werden müssen, da er sie nicht oder nur in unzureichender Menge selbst herstellen kann. Sie sind zur Unterstützung des gesamten Stoffwechsels, der körpereigenen Energiebereitstellung und des Immunsystems unerlässlich.

Diese Vitalstoffe werden aber nicht immer in ausreichender Menge mit der täglichen Nahrung aufgenommen.

SUPRADYN® FORTE – SPEZIELLE FORMULIERUNG FÜR DAS IMMUNSYSTEM UND BEI ERHÖHTEM BEDARF

Zunehmende körperliche Belastung in Beruf und Alltag, einseitige Ernährung sowie der Konsum von Genussmitteln können einen erhöhten Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen zur Folge haben.

Supradyn® forte enthält eine Kombination aus 13 Vitaminen, 9 Mineralstoffen und Spurenelementen sowie Coenzym Q10. Durch die sorgfältige Zusammensetzung der Inhaltsstoffe ist Supradyn® forte optimal geeignet für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Die tägliche Einnahme trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei und hilft Ihnen sich fit und aktiv zu fühlen.

Die Vitamine A und C, sowie Kupfer und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

Eisen, Magnesium, Vitamin B₂, B₆, B₁₂ sowie Niacin und Pantothensäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Eisen spielt zusätzlich eine bedeutende Rolle beim Sauerstofftransport im Körper.

Die Vitamine C und E, sowie die beiden Spurenelemente Selen und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Durch ihre antioxidativen Eigenschaften unterstützen sie den Körper dabei, sogenannte freie Radikale zu neutralisieren und dadurch deren schädliche Wirkung zu vermeiden. Zudem tragen die Vitamine Thiamin, B₂, B₆, B₁₂, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Vitamin C sowie Eisen, Kupfer, Jod und Mangan zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.

WAS IST IN SUPRADYN® FORTE BRAUSETABLETTEN ENTHALTEN?

Eine Brausetablette enthält:

% NRV*

Vitamine

Vitamin A	800 µg	100 %
Vitamin B1 (Thiamin)	3,3 mg	300 %
Vitamin B2 (Riboflavin)	4,2 mg	300 %
Vitamin B6	2 mg	143 %
Vitamin B12	3 µg	120 %
Vitamin C	180 mg	225 %
Vitamin D	5 µg	100 %
Vitamin E	12 mg	100 %
Vitamin K	25 µg	33,3 %
Pantothensäure	18 mg	300 %
Biotin	50 µg	100 %

Folsäure	200 µg	100 %
Niacin	48 mg	300%

Mineralien und Spurenelemente

Kalzium	120 mg	15 %
Magnesium	80 mg	21 %
Eisen	14 mg	100 %
Kupfer	1000 µg	100 %
Jod	150 µg	100 %
Mangan	2 mg	100 %
Selen	50 µg	91 %
Molybdän	50 µg	100 %
Zink	10 mg	100 %
Andere		
Coenzym Q10	4,5 mg	k.A.

*) Prozent der Nährstoffbezugswerte für die tägliche Zufuhr nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011.

WIE UND WIE OFT KÖNNEN SIE SUPRADYN® FORTE BRAUSETABLETTEN EINNEHMEN?

Empfohlene Anwendung für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
1 Brausetablette pro Tag. Die Einnahme erfolgt am besten mit oder nach einer Mahlzeit.
Empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

WIE SOLLTEN SUPRADYN® FORTE BRAUSETABLETTEN AUFBEWAHRT WERDEN?

Vitamine sind empfindlich gegenüber Hitze, Sauerstoff, Feuchtigkeit und Licht. Bewahren Sie daher die Brausetabletten bitte in der Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Nicht über 25°C lagern. Das Behältnis fest verschlossen halten.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

SIND SUPRADYN® FORTE BRAUSETABLETTEN AUCH FÜR DIABETIKER GEEIGNET?

Sypradyn® forte Brausetabletten sind für Diabetiker geeignet.

WELCHE INHALTSSTOFFE SOLLTEN SIE WEITERS BEACHTEN?

Supradyn® forte Brausetabletten enthalten Aspartam (eine Phenylalaninquelle). Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Laktosefrei.

WO ERHALTEN SIE SUPRADYN® FORTE BRAUSETABLETTEN?

Supradyn® forte Brausetabletten erhalten Sie ausschließlich in Apotheken.
Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Apotheke und unter www.supradyn.at
Supradyn® is a registered trademark.

BAYER

NICHT RELEVANT FÜR PACKMITTEL**ZUSÄTZLICHE ANGABEN:**

Kontaktname	Bayer Austria Ges.m.b.H.
Kontaktadresse	Herbststraße 6-10, 1160 Wien
Land	Österreich
Umweltabgabe entpflichtet	ja
Anbruch	n.a.
Mindesthaltbarkeit ab Produktion/Werk (in Monaten)	24
Für Diabetiker geeignet	ja
BE	0,105 BE pro Brausetablette
Süßungsmittel	ja
Phenylalaninquelle	ja
Nährwertangaben	nein
alkoholfrei	ja
Allergene	nein

INTERNE BEMERKUNGEN:**Gleiches Blickfeld („Sichtfeld“)**

Die **Sachbezeichnung**, die **Nettofüllmenge**, das **Mindesthaltbarkeitsdatum** und ggf. der **Alkoholgehalt** müssen in einem Blickfeld sein (zumindest gleiche Kartonseite). Beim Mindesthaltbarkeitsdatum im Blickfeld kann auch auf eine Stelle verwiesen werden, wo das Datum mit diesem Wortlaut „Mindestens haltbar bis Ende:“ zu finden ist.

Mindestschriftgröße für Kleinbuchstaben von mindestens 1,2 mm. Bei Verpackungen und Behältnissen, deren Oberfläche weniger als 80 cm² beträgt, darf die Schrift ausnahmsweise 0,9 mm groß sein.

Grau unterlegte Bereiche sind Zusatzinformationen bzw. eine andere Packungsgröße.

Warnhinweise keine laut Basel (Mail 24.06.2014)

Schwangerschaft keine Info zu deklarieren laut Basel (Mail 24.06.2014)